



# Potansiyel CMV enfeksiyonunu kontrol etmek için idrar toplanması

## Ebeveyn kılavuzu

### (Collection of urine to check for potential CMV infection – Turkish)

Bugünkü sonuçlar çocuğunuzda işitme kaybı olabileceğini gösteriyor.

Bunun bir nedeni SMV (Sitomegalovirüs) denilen bir virüsün enfeksiyonu olabilir.

**Bu virüsü, bebeğin idrarını iki farklı günde inceleyerek bulmaya çalışacağız. (numuneler en az 24 saat arayla olmalıdır).**

**Lütfen idrarı aşağıda belirtildiği gibi toplayın / biriktirin.**

Lütfen top şeklindeki pamuğu, gece boyunca bebeğin bezinin içine yerleştirin.

Sabah, (verilen eldivenleri kullanarak) top şeklinde beze yerleştirdiğiniz pamuktan idrarı bebeğin isminin olduğu şişeye sıkın ve istek formu ile North Middlesex Hastanesi Sterling Way London N18 1QX' deki patoloji bölümüne veya 256 St Ann's Road N15 3TH adreste bulunan Laurels Healthy Living Centre'in Labaratuvar bölümüne götürün.

Lütfen kapağın sıkıca kapalı olmasından emin olun.

**Patient Advice and Liaison Service (PALS) - Hasta Tavsiye ve İrtibat Servisi**

Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551 li telefonu arayarak veya [whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net](mailto:whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net) internet adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa, lütfen 020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapacağız.

[Twitter.com/WhitHealth](https://twitter.com/WhitHealth)

[Facebook.com/WhittingtonHealth](https://facebook.com/WhittingtonHealth)

Whittington Health NHS Trust

Magdala Avenue

London

N19 5NF

Phone: 020 7272 3070

[www.whittington.nhs.uk](http://www.whittington.nhs.uk)

Date published: 19/06/2020

Review date: 21/05/2022

Ref: CYP/AudioI/CUCPCMWI/04-Turk

© Whittington Health

Please recycle

