

**Ferinject'in dięer ilalara bir etkisi olur mu?**

Ferinject, zmsemeyi engelleyebileceęinden, aęızdan alınan dięer demir ilaları ile aynı anda alınmamalıdır.

Aęızdan demir ilacı almanız gerekiyorsa, buna damardan demir alımının son dozundan en az 5 gn sonrasında bařlanmalıdır.

**Daha fazla bilgi iin;**

Ferinject hasta bilgi brořrne řu internet adresinden ulařabilirsiniz.  
[www.medicines.org.uk](http://www.medicines.org.uk)

**Patient advice and liaison service (PALS) - Hasta Tavsiye ve İrtibat servisi**

Eęer vg ve řikayetiniz veya endiřeniz var ise ltfen 020 7288 5551'li telefonu arayarak veya [whh-tr.PALS@nhs.net](mailto:whh-tr.PALS@nhs.net) adresine E-posta gndererek PALS servisimiz ile iletiřime geiniz.

Eęer bu brořrn byk baskılı, sesli veya tercme edilmiř kopyasına ihtiyacınız varsa, ltfen [whh-tr.patient-information@nhs.net](mailto:whh-tr.patient-information@nhs.net) adresine E-posta gnderiniz. İhtiyalarınızı karřılamak iin elimizden geleni yapacaęız.

Twitter.com/WhitHealth  
Facebook.com/WhittingtonHealth

Whittington Health NHS Trust  
Magdala Avenue  
London  
N19 5NF  
Phone: 020 7272 3070  
[www.whittington.nhs.uk](http://www.whittington.nhs.uk)

Date published: 31/08/2022  
Review date: 05/08/2024  
Ref: ACW/Pharm/F(FC)II/02-Turk

© Whittington Health  
Please recycle

**Ferinject®  
(Ferrik Karboksimaltoz)  
Damardan Demir Alımı****Hasta rehberi****Ferinject® (ferric carboxymaltose)  
Intravenous Iron -Turkish**

### Ferinject nedir?

Ferinject içeriğinde demir bulunan bir ilaçtır.

### Ferinject'i neden alıyorum?

Ferinject demir eksikliği anemisi tedavisi için aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

- Ağız yoluyla demir alımı yeterince etkili olmadığında.
- Ağız yoluyla demir alımına vücudun tepki göstermesi durumunda.
- Doktorunuz demir depolarınızı doldurmak için çok hızlı bir şekilde demire ihtiyacınız olduğuna karar verdiğinde.

### Ne kadar doz alacağım?

Ferinject verilmeden önce tartılmanız ve kan testi yaptırmanız gereklidir. İhtiyacınız olan dozu hesaplamak için kilonuz ve hemoglobin kan testinizin sonucu kullanılacaktır.

Doğru dozu almak için damardan demir alımına, en az bir hafta aralıkla, iki kez gelmeniz gerekebilir.

### Ferinject nasıl verilir?

Demir ilacını kolunuzdaki bir damardan damla olarak alacaksınız. Bu, 250ml'ye kadar bir hacimde olup, kahverengi bir çözelti olarak görülecektir.

Genellikle 15 dakikalık bir süre içinde tamamlanır.

### Hangi durumlarda Ferinject verilemez?

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda Ferinject'in size uygun olup olmadığını anlatmak için sizinle konuşmak isteyecektir:

- Karaciğer sorunuz varsa
- Bir enfeksiyona yakalanmışsanız
- İltihaplı romatizma hastalığınız varsa
- Astım, egzama veya başka alerjileriniz varsa

### Hangi koşullarda Ferinject alınmamalı?

Aşağıdaki belirtilen koşullarda Ferinject alınmaz:

- Ferrik karboksimaltoz veya karışımdaki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa
- Aneminiz demir eksikliğinden kaynaklanmıyorsa
- Vücudunuzda çok fazla miktarda demir varsa

### Yaygın olarak görülen yan etkileri nelerdir?

Her ne kadar herkeste görülmesi beklenmezse, tüm ilaçlar gibi, Ferinject de bazı kimselerde yan etkilere neden olabilir.

Karşılaşılabileceğiniz yan etkiler arasında:

- Baş ağrısı
- Yüksek tansiyon
- Zerk bölgesi tepkileri\*
- Sıcak basması
- Mide bulantısı
- Baş dönmesi

\* Ferinject'in zerk edilen bölgeden (kolunuza girdiği yerden) cildinizin altındaki dokuya sızdırma riski vardır. Bu ağrıya, iltihaplanmaya ve kolunuzda potansiyel olarak uzun sürebilecek kahverengi renk değişikliğine neden olabilir.

Sızıntı olursa, zerk etme işlemi durdurulur. Zerk işlemi esnasında giriş bölgesinde herhangi bir ağrı veya şişlik yaşarsanız lütfen bir hemşireye veya doktora söyleyiniz.

Nadiren, Ferinject aşağıda belirtilen alerjik tepkimelere neden olabilir:

- Kızarıklık (örn. kurdeşen)
- Nefes almada güçlük
- Dudak, dil, boğaz veya vücutta şişme
- Kaşıntı
- Hırıltı
- Göğüs ağrısı

Ferinject, bazı hastalarda düşük fosfat seviyelerine neden olabilir, ki bunu şöyle fark edebilirsiniz:

- **Kötüleşen** yorgunluk
- **Kemik/kas** ağrısı

Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal bir hemşireye veya doktora söyleyiniz.

Eğer zerk işlemi bitip eve döndükten sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz.